

5. Manuel y Keenoy B., Moorkens G., Vertommen J., Noe M., Nève J., De Leeuw I. Magnesium status and parameters of the oxidant-antioxidant balance in patients with chronic fatigue: effects of supplementation with magnesium // J Am Coll Nutr. 2000. Jun; 19(3): 374-82.

### **ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛИЧНОСТИ – СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

Вавилова Е.Е., Ткаченко А.В.

*МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный  
медицинский институт высшего  
сестринского образования»  
Краснодар, Россия*

Важнейшей функцией межличностного общения является коммуникативная. Особое значение эта функция имеет для медицинских работников. Известно, что хороший врач – это тот, после общения с которым пациенту стало лучше, независимо от приема препаратов и проведенных манипуляций. Наряду с главным – когнитивным – компонентом, немаловажными являются эмоциональный и поведенческий компоненты [1]. Выбору правильного поведения в процессе коммуникации способствует точное определение психотипа реципиента. Этому способствует система психологических векторов.

Ранее нами проведены исследования по определению психотипов группы студентов-медиков и выработке навыков общения на этой основе [2,3,4]. Проведенная работа позволила участникам группы улучшить взаимоотношения в группе. Знание особенностей психотипов партнеров значительно облегчает общение, снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций и ускоряет достижение поставленных целей

В настоящей работе исследована динамика изменения психотипов студентов КММИ ВСО. Метод исследования – компьютерное тестирование на основе теста Толкачева-Бородянского с компьютерной обработкой результатов [5].

В экспериментальной группе сохраняется преобладание желтого (Меркурий) и красного (Марс) векторов, однако это преобладание уже не является столь доминирующим, как в предыдущем опыте. Наблюдается увеличение синего (Плутон) и зеленого (Нептун) векторов, что может быть связано с возрастными изменениями.

Нами проведено сравнение успеваемости в группе студентов, ознакомленных с системой

психологических векторов, с показателями студентов контрольной группы студентов той же специальности, в которой показатель успеваемости до эксперимента был аналогичным. Установлено, что в экспериментальной группе этот показатель оказался на 6,8 -7,55 выше. Кроме того, студенты экспериментальной группы отмечают улучшение психологического климата в группе, уменьшение числа конфликтных ситуаций.

Умение определять психотип партнера (пациента) позволяет выбрать правильный стиль поведения и повышает эффективность коммуникации.

#### **Литература:**

1. Крысько В. Г.. Социальная психология: Курс лекций 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2006. 352 с.
2. Ткаченко А.В., Соколова А.С. Определение психотипа личности с помощью системы психологических векторов. Международная НПК «Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспект», Курск, 2012, 4с., электронное издание, № рег. в Информрегистр 0321201551.
3. Ткаченко А.В., Обухова Н.А., Соколова А.С. Коммуникабельность как производное психоанализа. Тезисы доклад 39 НПК ЮФО, ч.1, Краснодар, 2011, с.182-183
4. Ткаченко А.В., Соколова А.С., Азаркин Е.В. Система векторов: социально-психологический аспект. 16 Межвузовская НПК с международным участием «Проблемы и перспективы научных исследований», Краснодар, 2012, с.102-104
5. Векторная психология – тест Толкачева-Бородянского //psy8.ru

### **ТЕРАТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ**

Вальман Л.К., Мельник Е.Г.

*МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный  
медицинский институт высшего  
сестринского образования»  
Краснодар, Россия*

Одной из основных причин, приводящих к патологии беременности, родов, внутриутробного развития плода, заболеваний новорожденного, а также проблем зачатия является воздействие на организм женщины целого ряда тератогенных факторов, к числу которых относится злоупотребление алкоголем, наркотиков, курения и ряда лекарственных препаратов. Особенно опасно воздействие вышеука-